

NA CZYM POLEGA BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE (USG)?

Badanie USG jest bezpieczne i bezbolesne. Polega na przesuwaniu małej głowicy po brzuchu osoby badanej. Badanie trwa zaledwie kilka minut (ok. 10 min.).

JAKIE JEST DALSZE POSTĘPOWANIU PO ROZPOZNANIU „TĘTNIKA AORTY BRZUSZNEJ”?

Pacjenci z rozpoznaniem TAB wymagają badań kontrolnych. Przy poszczególnych wymiarach aorty brzusznej zaleca się:

- 3 – 4,4 cm - kontrolne badanie raz w roku;
- 4,5 – 5,4 cm - kontrolne badanie co 3 miesiące;
- <5,5 cm - skierowanie do specjalisty chirurgii naczyniowej i rozważenie operacji.

Wczesne wykrywanie choroby ratuje Ci życie!!!

**PAMIĘTAJ, LICZY SIĘ PROFILAKTYKA!!!
BO TĘTNIAK AORTY JAK BOMBA TYKA!!!**

Informacje o miejscach realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej:

www.kujawsko-pomorskie.pl

w zakładce tematycznej „Zdrowie”- Programy polityki zdrowotnej – informacje dla mieszkańców

tel. 56 652 18 22.

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIKA AORTY BRZUSZNEJ”




- JESTEŚ MĘŻCZYZNĄ ☒
- MASZ 65-74 LATA ☒
- PALISZ PAPIEROSY ☒
- MIESZKASZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM ☒

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ USG AORTY BRZUSZNEJ

CO TO JEST TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ ?

AORTA jest głównym naczyniem krwionośnym, który rozprowadza krew po organizmie. Biegnie od serca w dół klatki piersiowej i jamy brzusznej. Wraz z wiekiem ściany aorty brzusznej u pewnych osób mogą ulec osłabieniu i wypukleniu tworząc **Tętniak Aorty Brzusznej (TAB)**, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jeśli nie jest wcześniej wykryty.



CZY TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ TO POWAŻNA CHOROBA?

Tętniak Aorty Brzusznej (TAB) to bardzo poważna choroba, zwłaszcza jeśli jest nierozpoznana odpowiednio wcześniej. Ciśnienie tętnicze krwi wytwarzane przez bijące serce powoduje uderzenia krwi o osłabioną ścianę tętniaka, co powoduje jego powiększanie.

Powiększanie się tętniaka może doprowadzić w końcu do jego **pęknięcia**. Następuje wtedy krwotok wewnętrzny, który jest zwykle **śmiertelny**. Jedynym sposobem by tego uniknąć jest rozpoznanie tętniaka aorty brzusznej zanim pęknie.

Częstość występowania tętniaka aorty brzusznej szacuje się na **7,6% u mężczyzn w wieku 65 lat i więcej**, w porównaniu z częstością występowania u kobiet w tej samej grupie wiekowej to **1,3%**. Z każdą kolejną dekadą częstość występowania tętniaka u mężczyzn **zwiększa się o około 6%**.

Dzięki programowi masz możliwość wcześniej wykryć chorobę !!!!!

Jeśli cierpisz na TAB **możesz nie mieć żadnych objawów**. Choroba ta często **nie daje żadnych dolegliwości** co oznacza, że możesz nie zdawać sobie sprawy, że **jesteś w dużym niebezpieczeństwie**.

CZYNNIKI RYZYKA WYSTĄPIENIA TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ

- Wiek 65 lat i więcej
- Płeć męska
- Palenie tytoniu
- Nadciśnienie tętnicze
- Hipercholesterolemia
- Choroba wieńcowa serca
- Choroby naczyń krążenia mózgowego
- Występowanie tętniaka aorty brzusznej w rodzinie